

Pentamidine isethionate



Marca comercial: Nebupent

Clase de medicamento: Infecciones oportunistas y otros

El isetionato de pentamidina, conocido también como Pentam 300 ó Nebupent, es un tipo de medicamento llamado antiprotozoario. Estos productos ayudan al cuerpo a combatir las infecciones causadas por protozoarios, que son microorganismos microscópicos causantes de enfermedad.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El isetionato de pentamidina fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos el 15 de junio de 1989 para uso en el tratamiento de la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* (antiguamente *Pneumocystis carinii*) (PCP), una infección oportunista que afecta a las personas con infección por el VIH/SIDA. Por lo general, se emplea pentamidina solo cuando los pacientes con PCP no pueden tolerar el tratamiento de primera línea con sulfametoxazol-trimetoprima.

Presentación/Administración

Se administra en solución inhalable o en inyección intramuscular o intravenosa.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier afección de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Junto con sus efectos deseables, el isetionato de pentamidina puede causar algunos efectos adversos. Entre sus efectos secundarios adversos cabe citar somnolencia; enrojecimiento y sequedad de la piel; aliento con olor a frutas; sed intensa; aumento de la micción; inapetencia; valores elevados en los exámenes de la función hepática; ansiedad; escalofrío; sudor frío; enfriamiento y palidez de la piel; dolor de cabeza; hambre intensa; náusea; nerviosismo; temblor; visión borrosa; confusión; mareo; desmayo; cansancio o debilidad poco comunes; dolor de garganta o fiebre; micción menos frecuente; hemorragia o hematomas poco comunes; pulso rápido o irregular; anomalías en el electrocardiograma (ECG); taquicardia ventricular conocida como torsades de pointes (latido cardíaco anormal); erupción cutánea; enrojecimiento; prurito; fiebre; o dolor, enrojecimiento o endurecimiento del sitio de la inyección. Los pacientes deben informar al médico sobre cualquiera de esos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo del medicamento. Entre los efectos secundarios menos graves de este

medicamento están náusea o vómito, inapetencia, diarrea y sabor metálico desagradable. Los pacientes deben informar al médico si esos efectos secundarios continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian pentamidine isethionate, visite el sitio web de AIDSinfo:

<http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba pentamidine isethionate. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español.

Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de [clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Pentamidine AND HIV infections.

Fabricantes

Nebupent
American Pharmaceutical Partners
1501 East Woodfield Drive
Suite 300 East
Schaumburg, IL 60173-5837
(849) 969-2700

Pentamidine
Fujisawa Healthcare Inc
Parkway Center North / 3 Parkway North
Deerfield, IL 60015-2548
(800) 727-7003

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en

Pentamidine isethionate



Para más información (cont.)

información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este